

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

## 目の疲れ・かすみに

**目薬** スマイル40EXマイルド 第2類医薬品

**トリプルビタミン処方(基準内最大数配合※)**

**疲れ**

スマイル40EXマイルド

**かすみ**

目への

**主な効能**

**かゆみ**

**充血**

※一般用眼科用製造販売承認基準

### ⚠ 使用上の注意

#### 🗨️ 相談すること

- 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
  - 医師の治療を受けている人。(2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
  - 薬によりアレルギー症状を起したことがある人。
  - 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人。…緑内障
- 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
  - 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- 目のかすみが改善されない場合
- 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

### ● 効能


目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)、結膜充血、目のかゆみ、眼瞼炎(まぶたのただれ)、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

### ● 用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。(汚染や異物混入(目やにやホコリ等)の原因になります。)
- ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- 点眼用にのみ使用してください。



### ● 成分(100mL中)

有 効 成 分	含 量	はたらき
レチノールパルミチン酸エステル(ビタミンA)	30,000単位	角膜に直接働き、目の機能を活性化するビタミンです。
酢酸d-α-トコフェロール(天然型ビタミンE)	0.05g	血行を促進して、栄養を瞳に補給するビタミンです。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)	0.04g	新陳代謝を促す作用があるビタミンです。
L-アスパラギン酸カリウム(栄養成分)	1.0g	目に酸素を取り込む栄養成分です。
塩酸テトラヒドロゾリン	0.01g	目の充血を抑えます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.03g	充血や目のかゆみなどの不快な症状を抑えます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	0.005g	目のピント調節機能を改善します。
イブシロン-アミノカプロン酸	2.0g	目の炎症を鎮めます。

\*添加物として、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、BHT、塩化ベンザルコニウム、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、プロピレングリコール、l-メントール、dl-カンフルを含む。

### ● 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- 他の人と共用しないでください。
- 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。

お問い合わせ先

ライオン株式会社 お客様相談室

☎(03)3621-6100

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日を除く)

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7