

しっしん・かぶれ・かゆみ・皮ふ炎に 第②類医薬品  
**エルモディアPE 軟膏**  
湿疹・皮ふ炎治療薬

〔エルモディアPE軟膏の特徴〕

- プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA)は、アンテドラッグのステロイド剤で、湿疹や皮ふ炎等の炎症を鎮めます。

アンテドラッグ……皮ふ表面の患部で高い消炎効果を発揮したのち、体内に吸収されると低活性となる性質を持つ薬剤の総称です。そのためステロイド特有の副作用を起こしにくい特性をもっています。

- 局所麻酔作用により、かゆみを抑える成分として、リドカインを配合しています。
- 殺菌作用のある成分として、イソプロピルメチルフェノールを配合しています。



使用上の注意



してはいけないこと

く守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります

1. 次の部位には使用しないでください。

- (1) 水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
- (2) 目の周囲、粘膜等

2. 顔面には広範囲に使用しないでください。

3. 長期連用しないでください。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (4) 患部が広範囲の人
- (5) 湿潤やただれのひどい人

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
皮 膚 (患 部)	みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 〔\*効能・効果〕

湿疹、皮ふ炎、あせも、かぶれ、かゆみ、虫さされ、じんましん




## 〔用法・用量〕

1日数回、適量を患部に塗布してください。

### 〈用法・用量に関連する注意〉

1. 定められた用法・用量をお守りください。
2. 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3. 目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4. 外用にのみ使用してください。

### 〈チューブの穴の開け方〉



キャップを逆さにして、突起部をチューブの先に強く押し当ててください。

## 〔成分・分量〕

成分	含量 (100g中)	はたらき
プレドニゾン吉草酸エステル 酢酸エステル (PVA)	0.15g	湿疹・皮ふ炎等のはれ・赤みを抑えます。
リドカイン	1.0g	局所麻酔作用により、かゆみを鎮めます。
イソプロピルメチルフェノール	0.1g	患部を殺菌消毒します。
トコフェロール酢酸エステル	0.5g	血行を促進し、症状の回復を早めます。

添加物として、ミリスチン酸イソプロピル、セトステアリルアルコール、N-(ヘキサデシロキシヒドロキシプロピル)-N-ヒドロキシエチルヘキサデカナミド、流動パラフィン、白色ワセリン、パラフィンを含みます。

## 〔保管及び取扱い上の注意〕

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
4. 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

### 製品についてのお問い合わせ

- お買い求めの販売店
- ジャパンメディック株式会社 お客様相談窓口：076-438-1107  
〔受付時間：月～金（祝祭日・年末年始を除く）9：00～17：00〕

副作用被害救済制度の問合せ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元  
**ジャパンメディック株式会社**  
富山県富山市横越168