

本品に添付文書はありませんので、ラベル画像を掲載します。

4987305322227



副作用被害救済制度  
電話:0120-149-931

8-1

リコリス 20mL  
「ゼンヤク」  
小児用



第2類医薬品

〔効能・効果〕**幼児の発育期・偏食  
児・発熱性消耗性疾患・病中病後・  
胃腸障害・栄養障害などの栄養  
補給、虚弱体質、滋養強壮。**

製造販売元 **全薬工業株式会社**  
東京都文京区大塚5-6-15  
全薬工業お客様相談室 TEL 03(3946)3610

販売名：リコリス「ゼンヤク」小児用

**使用上の注意** \*本剤は小児用ですが、滋養強壮保健薬として定められた一般的な注意事項を記載しています。

してはいけないこと(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)長期連用しないこと。

相談すること 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病 2.服用後、まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師の診療を受けること。●偽アルドステロン症、ミオパチー：手足のだるさ、しびれ、つっぱり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。3.5～6日間服用しても症状がよくなりません場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

(用法・用量)3才以上15才未満、1回1びん(20mL)を1日3回服用。

\*小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させること。

(成分)(1びん20mL中)カンゾウ(甘草)エキス100mg(原生薬換算量500mg)、グルコン酸カルシウム水和物100mg、リボフラビン0.67mg、オロチン酸コリン25mg、タウリン100mg、パンテノール3.33mg  
添加物としてアルコール、安息香酸Na、パラベン、カラメル、チンピチンキ、白糖、水アメ、dl-リンゴ酸Naを含有します。

**保管及び取扱い上の注意**

(1)直射日光のあたらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手のとどかない所に保管すること。(3)使用期限を過ぎた製品は、服用しないこと。(4)キャップの切り口で手指等を切らないように注意すること。

使用  
期限  
(年・月)  
製造  
番号

