

サンケイ


デナポン[®]5%ベイト

NAC粒剤

根を切る虫に
確かな効き目!



ダンゴムシ



コオロギ



ネキリムシ



サンケイ化学株式会社

®は長瀬産業(株)の登録商標

サンケイ

®

デナポン5%ベイト

有効成分:NAC 5.0%
 性状:淡褐色粒状4~7mm
 毒性:普通物
(毒物に該当しないものを指していう)
 有効年限:4年
 包装:2kg×8



- 害虫を誘引し、摂食して効果を発揮するベイト剤です。
- ネキリムシ類、ハスモンヨトウ、コオロギ、ダンゴムシに対して優れた防除効果を示します。
- 株元に散布するだけで省力的に害虫防除ができます。

適用病害虫名および使用方法


2009年9月16日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	10アール当り 使用量	使用時期	本剤及びNACを含む 農薬の総使用回数	使用方法
キャベツ	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg	収穫14日前まで	3回以内	株元散布
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg			
はくさい	ハスモンヨトウ ネキリムシ類	3~6kg	収穫21日前まで		
	コオロギ ダンゴムシ	3~4kg			
だいこん	ネキリムシ類	3~6kg	収穫30日前まで	4回以内	株元処理
たばこ			移植時	—	

【デナポン5%ベイトの形状】



【上手な使い方】



混和せずに、土壌表面の作物の株元に散布しましょう。

⚠ 使用上の注意事項

- 使用量に合わせ秤量し、使いきってください。
- たばこの芯葉に付着すると薬害を生ずるのでかからないように注意してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。

⚠ 安全使用上の注意事項

- 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当てを受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当てを受けてください。
- 本剤による中毒の治療法としては硫酸アトロピン製剤の投与が有効です。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。また粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。

⚠ 水産動植物に係る注意事項

- 水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●幼児の手の届く所に置かないでください。

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目13-1 ☎(048) 551-2122
 大阪営業所 〒532-0011 大阪府淀川区西中島 4丁目5-1 ☎(06) 6305-5871