

ガードベイト®A

ペルメトリン粒剤



ネキリムシから大切な作物を守る!!



サンケイ化学株式会社

®はサンケイ化学(株)の登録商標

ガードベイト® A

農林水産省登録 第20919号
 有効成分: ベルメトリン 0.1%
 性状: 淡赤色粒状
 毒性: 普通物
(両剤物に該当しないものを指している通称)
 包装: 2kg×8



- ネキリムシを誘引し、摂食させることで効果を発揮するベイト剤です。
- 成分は合成ピレスロイドなので、優れた殺虫・被害防止効果があります。
- 赤色の粒剤ですので、散布したところがよくわかります。

適用病害虫名および使用方法


平成26年8月27日現在の登録内容

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベルメトリンを含む農薬の総使用回数
はくさい、ごぼう	ネキリムシ類	3kg/10a	は種時～生育初期	5回以内	株元散布	5回以内
だいこん				4回以内		4回以内
キャベツ、レタス ブロッコリー カリフラワー			生育初期	5回以内		5回以内
なす、トマト				3回以内		3回以内
ミニトマト			1回	1回		
かぶ			収穫3日前まで	4回以内		4回以内
にら にら(花茎)				3回以内		3回以内
にんじん			生育初期但し収穫7日前まで	5回以内		5回以内
かぼちゃ いちご、たまねぎ かんしょ、やまのいも ピーマン、さといも			生育初期			2回以内
ほうれんそう しゅんぎく				4回以内		4回以内
とうもろこし ばれいしょ			3回以内	3回以内		3回以内
ねぎ、わけぎ あさつき、そらまめ だいず、きゅうり						
てんさい			生育初期	2回以内		2回以内
なばな類						
オクラ			定植時～発芽期 但し収穫120日前まで	4回以内		4回以内
豆類(未成熟)						
とうがらし類			収穫前日まで	3回以内		3回以内
しょうが						
葉しょうが			生育初期但し収穫7日前まで	3回以内		3回以内
アスパラガス、バセリ						
エンダイブ			収穫30日前まで	3回以内		3回以内
もりあざみ						
エンサイ			定植時	1回		1回
飼料用とうもろこし (青刈り)						
いんちんこう						
食用おおぼこ(種子)						
花き類・観葉植物						
たばこ						

⚠ 使用上の注意事項

- 作物体上から作物の地際表面に散布してください。
- 蚕に長期間毒性があるので、散布された薬剤が飛散し、付近の桑に付着する恐れのある場所では使用しないでください。
- ミツバチに対して影響があるので、ミツバチの巣箱及びその周辺にかけないようにしてください。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に被害の有無を十分確認してから使用してください。
なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることをおすすめします。
- 誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。
本剤使用中に身体に異常を感じた場合には、直ちに医師の手当を受けてください。
- 散布の際はマスク、手袋などをしてください。また、粉末を吸い込んだり浴びたりしないよう注意し、作業後は手足、顔などを石鹸でよく洗い、うがいをしてください。
- 本剤による中毒の治療法としては動物実験で外カルバモール製剤の投与が有効であると報告されています。
- 犬、猫などのペット類や家畜、家禽等が誤食する恐れがあるので、食べる可能性のある場所での保管及び使用はしないでください。
- 直射日光を避け、子供の手の届かないよう低温で乾燥した場所に密封して保管してください。

【上手な使い方】



混和せずに、土壌表面の作物の株元に散布しましょう。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所に置かないでください。

NIK-GBA2014.09S

取扱い



サンケイ化学株式会社

東京本社 〒110-0005 東京都台東区上野 7-6-11 ☎(03) 3845-7951
 東京営業部 〒366-0032 埼玉県深谷市幡羅町1丁目 13-1 ☎(048) 551-2122
 大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島 4丁目 5-1 ☎(06) 6305-5871