

**10作物に
適用拡大!**

カステード®乳剤

®=BASF社の登録商標



脱皮阻害型殺虫剤 いろいろな害虫に効く!いろいろな作物に使える!

特長

1. チョウ目、アザミウマ目、ダニ目、カメムシ目、ハエ目など幅広い害虫に効果!
2. 適用作物が広い。100種類以上の作物に使用可能!
3. 独特な作用機作と優れた残効性
4. 天敵類に影響が少ない
5. EU/台湾向けのお茶・りんごにも使用可能!



■主な適用害虫



■適用病害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数		
りんご	ナミハダニ リンゴハダニ	2000	200~700ℓ /10a	収穫14日前まで	2回以内		
	キンモンホソガ ギンモンハモグリガ	2000~4000					
	ハマキムシ類	2000~6000					
	ヨモギエダシャク	4000					
なし	ハダニ類 ハマキムシ類	2000		収穫21日前まで			
	ハダニ類 ハマキムシ類	4000					
もも	ハダニ類 ハマキムシ類	2000~4000		収穫7日前まで			
	モモハモグリガ	2000~4000					
小粒核果類	ケムシ類	2000		収穫3日前まで			
ネクタリン	ハダニ類 ハマキムシ類	4000					
	モモハモグリガ	2000~4000					
	おうとう	ハマキムシ類 ヒメシロモンドクガ	4000				
かんきつ	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ ミカンサビダニ	2000~4000	収穫7日前まで				
	ヨモギエダシャク	4000					
	ミカンハダニ	1000~2000					
かき	カキノヘタムシガ	4000	収穫14日前まで				
	カキクダアザミウマ	2000~4000					
マンゴー	チャノキイロアザミウマ	2000	収穫3日前まで				
食用さくら(葉)	アザミウマ類		収穫7日前まで				
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノミドリヒメヨコバイ チャハマキ ヨモギエダシャク チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ チャノナガサビダニ ツマグロアオカスミカメ	4000	200~400ℓ /10a	摘採7日前まで			
	コナガ アオムシ タマナギンウバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	2000~4000			100~300ℓ /10a		
	はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ				2000~4000	収穫7日前まで
	だいごん	アオムシ コナガ				2000~4000	
	はつかだいごん	ハイマダラノメイガ				4000	収穫14日前まで
	わさびだいごん	コナガ				2000~4000	
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000	収穫7日前まで				
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000~4000					
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	4000	収穫7日前まで				
レタス 非結球レタス くちししゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ						
トマト	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~4000	100~300ℓ /10a	4回以内			
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000					
ミニトマト	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000	収穫前日まで				
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~4000					
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000					
なす	ミカンキイロアザミウマ	2000	収穫前日まで				
	マメハモグリバエ ハダニ類	2000~4000					
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000	4回以内				
ししとう	オオタバコガ	2000					
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000	収穫7日前まで				
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、セルリーを除く)	ハスモンヨトウ						
パセリ							
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000	収穫7日前まで				
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで			

■使用方法：散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで	2回以内
だいごん	アオムシ コナガ	2000~4000		収穫14日前まで	3回以内
はつかだいごん	ハイマダラノメイガ	4000			1回
わさびだいごん	コナガ	2000~4000		収穫7日前まで	3回以内
非結球あぶらな科葉菜類	コナガ アオムシ マメハモグリバエ	2000		収穫7日前まで	2回以内
なばな類	ヨトウムシ類 ハモグリバエ類	2000~4000		収穫21日前まで	3回以内
ブロッコリー	ハスモンヨトウ	4000		収穫7日前まで	2回以内
レタス 非結球レタス くちししゃ	ハスモンヨトウ オオタバコガ				
トマト	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~4000		100~300ℓ /10a	4回以内
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000			
ミニトマト	ミカンキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000	収穫前日まで		
	マメハモグリバエ オオタバコガ	2000~4000			
	ハスモンヨトウ トマトサビダニ	4000			
なす	ミカンキイロアザミウマ	2000	収穫前日まで		
	マメハモグリバエ ハダニ類	2000~4000			
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	4000	4回以内		
ししとう	オオタバコガ	2000			
甘長とうがらし	ミナミキイロアザミウマ	4000	収穫7日前まで		
せり科葉菜類 (みつば、パセリ、セルリーを除く)	ハスモンヨトウ				
パセリ					
セルリー	マメハモグリバエ コナジラミ類 ハスモンヨトウ	4000	収穫7日前まで		
キャベツ	コナガ アオムシ タマナギンウバ ハスモンヨトウ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ	2000~4000	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで	

■適用病害虫と使用方法 (色文字が適用拡大部分)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数	
みつば	ハスモンヨトウ ハダニ類 キアゲハ	2000	100~300ℓ/10a	収穫7日前まで 但し、伏せ込み栽培は伏せ込み前まで	2回以内	
ねぎ	シロイチモジヨトウ ネギハモグリバエ ネギアザミウマ クロバネキノコバエ類	4000		収穫14日前まで	3回以内	
いちご	ハスモンヨトウ ミカンキイロアザミウマ			収穫前日まで	4回以内	
きゅうり	ミナミキイロアザミウマ ウリノメイガ トマトハモグリバエ	2000~4000 2000				
すいか	ミナミキイロアザミウマ オオタバコガ マメハモグリバエ シロイチモジヨトウ	2000~4000 4000		収穫7日前まで	3回以内	
メロン	ミナミキイロアザミウマ タバココナジラミ類 (シルバーフコナジラミを含む) トマトハモグリバエ	2000~4000				
かぼちゃ	トマトハモグリバエ			収穫前日まで	1回	
うり類(漬物用) (しろうり、とうがんを除く)	ミナミキイロアザミウマ	2000		収穫3日前まで		
しろうり	ウリノメイガ ミナミキイロアザミウマ			収穫前日まで		
とうがん	ミナミキイロアザミウマ			収穫3日前まで		
にがうり	マメハモグリバエ ウリノメイガ アザミウマ類	2000~4000		収穫前日まで	4回以内	
ズッキーニ	トマトハモグリバエ	2000		収穫前日まで	2回以内	
未成熟 とうもろこし	アワノメイガ オオタバコガ	2000~4000 4000				
てんさい	ヨトウムシ シロオビノメイガ デンサイモグリハナバエ カメノコハムシ ナミハダニ アシグロハモグリバエ ヨトウムシ	2000~4000 4000 1000		25ℓ/10a	収穫7日前まで	4回以内
アスパラガス	ハスモンヨトウ オオタバコガ アザミウマ類	4000		収穫前日まで	2回以内	
しゅんぎく	マメハモグリバエ アザミウマ類 ハスモンヨトウ ヨトウムシ	2000~4000		収穫7日前まで		
ほうれんそう	ハスモンヨトウ マメハモグリバエ シロオビノメイガ ホウレンソウケナガコナダニ アシグロハモグリバエ	4000		100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	3回以内
さやえんどう 実えんどう	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ				2回以内	
そらまめ 未成熟そらまめ	マメハモグリバエ ハスモンヨトウ	2000 4000		3回以内		
さやいんげん	マメハモグリバエ ハスモンヨトウ	2000 4000		2回以内		
未成熟ささげ	ハスモンヨトウ	4000				

■使用方法:散布

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	使用回数
未成熟ふじまめ	ハスモンヨトウ	3000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内
えだまめ	ハスモンヨトウ ウコンノメイガ カメムシ類	4000			
だいず	カメムシ類*1	32	0.8ℓ/10a	収穫7日前まで	3回以内
あずき	ナミハダニ アズキノメイガ ハスモンヨトウ	4000			
みょうが ¹ (花穂)*2	ハスモンヨトウ	2000	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内
みょうが (莖葉)					
しそ(花穂) しそ科葉菜類 (パセリを除く)	ハスモンヨトウ	4000	100~300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回以内
パセリ					
にんじん					
タラゴン					
つるむらさき					
ゆきのした ふだんそう モロヘイヤ					
かんしょ					
食用トレンシア					
食用ミニバラ					
きく(葉)					
食用ざく きく ガーベラ	2000	収穫14日前まで			
ばら	ハダニ類 ミカンキイロアザミウマ	1000 2000	収穫7日前まで		
宿根かすみそう	シロイチモジヨトウ	4000	2000	3回以内	
スターチス	ハスモンヨトウ				
ソリダゴ	シロイチモジヨトウ ハスモンヨトウ				
宿根アスター	シロイチモジヨトウ				
はばたん	コナガ				
けいとう	シロオビノメイガ				
カーネーション ほおずき	タバコガ				
りんどう	リンドウホソハマキ	4000			

*1 だいず・カメムシ類の使用方法:無人ヘリコプターによる散布
*2 みょうが(花穂)の使用方法:散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する

■マイナー作物等の登録拡大に伴いグループ化した作物名

■うり類(漬物用):赤毛ウリ、食用ひょうたん、食用へちま、しろうり、漬物すいか、漬物まくわうり、漬物メロン、とうがん、はやとうり、ゆうがお ■非結球レタス:かきちや、サラダ菜、立ちちや、美味タス、リーフレタス ■非結球あぶらな科葉菜類:あざみな、あじみな、海野(莖葉)、大山そだち、カーポロネコ、かほくな、からしな、木曾菜、ケール、こまつな、さがみグリーン、さぬきな、ざんとうさい、四州搾菜(莖葉)、しろな、仙台芭蕉菜、仙台雪菜、千宝菜1号、千宝菜2号、タアサイ、たいさい、たかな、食べて菜、チンゲンサイ、てごろ菜、長崎はくさい、なかじまな、のざわな、博多白菜、バクチョイ、はたけな、ひこしまはるな、ビタミン菜、姫路若菜、ひろしまな、べんり菜、みずな、みぶな、山形みどりな、やまとまな、ルッコラ、わさびな ■なばな類:あさまこな、あすっこ、アレッタ、おおさきな、太田かぶ、オータムポエム、大野菜、かいらん、かきな、勝山水菜、くきたちな、こうさいたい、さいしん、三景雪菜、四州児菜、チンゲンサイ(なばな栽培)、摘菜花、つぼみな、なばな、のらぼうな、博多蕾菜、はたけな(なばな栽培)、はなっこりー、みずかけな、めいけな ■しそ科葉菜類:えごま(葉)、オレガノ、しそ、セージ、タイム、パセリ、はっか、レモンバーム、ローズマリー ■せり科葉菜類:きんさし、コリアンダー(葉)、せり、セルリー、チャービル、ディル(葉)、にんじん(葉)、パセリ、フェンネル(葉)、みつば ■小粒核果類:うめ、すもも、あんず

このチラシの記載内容は2017年8月現在のものです。

- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理してください。●防除日誌を記載しましょう。

BASFジャパン株式会社

〒106-6121 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー21階
☎0120-014-660 ☎03-3796-9419 <https://agriculture.basf.com/jp>