

殺虫剤

名称: アクトラ顆粒水溶剤
種類: チアメキシサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
きゅうり	アブラムシ類 コナジラミ類	3000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(種子への処理及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	ミカンキイロアザミウマ	2000倍					4回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
トマト	コナジラミ類				2回以内		3回以内(育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は2回以内)
ミニトマト							4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
すいか	ミナミキイロアザミウマ	3000倍			3回以内		4回以内(種子への処理、育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	アブラムシ類						4回以内(種子への処理、育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
なす	コナジラミ類	2000倍					4回以内(種子への処理、育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	ミナミキイロアザミウマ マメハモグリバエ						4回以内(種子への処理、育苗期の株元散布及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	テントウムシダマシ類						
にがうり	ワタアブラムシ	収穫7日前まで		3回以内			
ピーマン	ミナミキイロアザミウマ	3000倍		収穫前日まで			4回以内(種子への処理及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)
	アブラムシ類						
	コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ						

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
とうがらし類(ししとうを除く)	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内(定植時の植穴処理は1回以内、散布は3回以内)
ししとう	コナカイガラムシ類 マメハモグリバエ						
キャベツ	アブラムシ類	2000～3000倍		収穫3日前まで			4回以内(粒剤の処理、水溶剤及び水和剤の灌注は合計1回以内、水溶剤及び液剤の散布は合計3回以内)
		100倍		セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3～4L)当たり0.5L			
はくさい		3000倍	100～300L/10a	収穫3日前まで	3回以内	散布	4回以内(粒剤の処理、水溶剤及び水和剤の灌注は合計1回以内、散布は3回以内)
		100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(30×60cm・使用土壌約3～4L)当たり0.5L	育苗期後半	1回	灌注	
レタス		2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	3回以内(種子への処理、水和剤の灌注及び粒剤の処理は合計1回以内、散布は2回以内)
だいこん							3回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
かぶ							3000倍

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
ばれいしょ	アブラムシ類	750倍	25L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	4回以内(植付時の作条混和は1回以内、植付後は3回以内)
		3000倍	100～300L/10a				
	テントウムシダマシ類 ナストビハムシ	2000倍					
しゅんぎく	アブラムシ類			収穫開始7日前まで	4回以内(は種時の作条混和は1回以内、散布は3回以内)		
ナモグリバエ	アブラムシ類	収穫前日まで					3回以内
実えんどう				3000倍	収穫7日前まで		
さやいんげん		1000～2000倍					3回以内(は種時及び植付時の作条混和は合計1回以内、散布は3回以内)
いんげんまめ	2000倍						
えだまめ だいず				カメムシ類 アブラムシ類	3000倍		
ねぎ		ネギアザミウマ ネギハモグリバエ		3000倍			
わけぎ	2000倍						
ブロッコリー	アブラムシ類	3000倍	収穫前日まで				

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアメキシサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメキシサムを含む農薬の総使用回数
カリフラワー	アブラムシ類	2000～3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	4回以内(育苗期の株元散布は1回以内、散布は3回以内)
非結球あぶらな科葉菜類(こまつな、ケール、チンゲンサイを除く)		2000倍		収穫3日前まで	2回以内		2回以内
チンゲンサイ							3回以内(定植時の作条混和は1回以内、散布は2回以内)
うこぎ		3000倍					2回以内
こまつな		2000倍					3回以内(は種時の作条混和は1回以内、は種後は2回以内)
ほうれんそう							3回以内(種子への処理及びは種時の作条混和は合計1回以内、散布は2回以内)
エンサイ				収穫14日前まで	3回以内		3回以内

殺虫剤

名称: アクトラ顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

適用の範囲と使用方法							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
みょうが(花穂)	コナカイガラムシ類	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布、但し花穂の発生期にはマルチフィルム被覆により散布液が直接花穂に飛散しない状態で使用する	3回以内
みょうが(茎葉)				みょうが(花穂)の収穫前日まで 但し、花穂を収穫しない場合は開花期終了まで		散布	
もも	アブラムシ類	3000倍	200～700L/10a	収穫前日まで			
	モモハモグリガ	2000～3000倍					
	シンクイムシ類 ミカンキイロアザミウマ カメムシ類	2000倍					
ネクタリン	アブラムシ類	3000倍					
	モモハモグリガ	2000～3000倍					
	シンクイムシ類 ミカンキイロアザミウマ カメムシ類	2000倍					
メロン	アブラムシ類	3000倍	150～300L/10a			4回以内(種子への処理及び定植時の植穴処理は合計1回以内、散布は3回以内)	
	ミナミキイロアザミウマ トマトハモグリバエ	2000倍					

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

適用の範囲と使用方法							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ゴマダラカミキリ成虫	4000倍	200～700L/10a	収穫14日前まで	3回以内	散布	3回以内
	アブラムシ類	3000倍					
	コナカイガラムシ類	2000～3000倍					
	ミカンハモグリガ						
	コアオハナムグリ						
	ケシキスイ類						
	アザミウマ類	2000倍					
ロウムシ類							
カメムシ類							
ミカンバエ							
ミカンキジラミ							
かんきつ(苗木)	ミカンハモグリガ	10倍	樹当たり10～100mL	春芽・夏芽又は秋芽の発生前	主幹部に吹きつけ		
	アブラムシ類	25倍	樹当たり20～100mL				
	ゴマダラカミキリ						
りんご	アブラムシ類	2000～3000倍	200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ギンモンハモグリガ						
	キンモンホソガ						
	コナカイガラムシ類						
	シンクイムシ類	2000倍					
	カメムシ類						
	リンゴワタムシ	3000倍					

殺虫剤

名称: アクタラ顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数	
なし	シンクイムシ類	2000倍	200～700L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
	コナカイガラムシ類							
	カメムシ類	3000倍						
チュウゴクナシキジラミ	2000倍							
小粒核果類(うめを除く)		アブラムシ類		2000～3000倍				
	うめ	カメムシ類			2000倍			
ぶどう	コナカイガラムシ類	2000倍						
	チャノキイロアザミウマ			2000～3000倍				
	フタテンヒメヨコバイ	2000倍						
おうとう	オウトウショウジョウバエ			収穫前日まで				
	カメムシ類				3回以内			
いちじく	アザミウマ類			3回以内				
かき	カメムシ類				3回以内			
	コナカイガラムシ類	3回以内						
	カキノヘタムシガ			3回以内				
てんさい	テンサイトビハムシ		50～200倍		ペーパーポット1冊当り1L(3L/㎡)	定植前	1回	苗床灌注
	カメノコハムシ	50倍						
	テンサイモグリハナバエ	100～200倍						
		100倍						
		アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	

殺虫剤

名称: アクター顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

適用の範囲と使用方法							
作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
モロヘイヤ	ネギアザミウマ	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	3回以内
オクラ	アブラムシ類		100～300L/10a	収穫前日まで			
食用へちま							
バナナ	バナナツヤオサゾウムシ		200～700L/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内
マンゴー	アザミウマ類			収穫14日前まで			
アセロラ	アブラムシ類			収穫7日前まで			
グアバ(果実)	バンジロウツノエグリヒメハマキ		100～300L/10a	収穫21日前まで	3回以内		3回以内
セージ	コナジラミ類			収穫14日前まで			
にら	ネギアザミウマ						
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	3000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	3回以内(は種前の塗沫処理は1回以内、は種後は2回以内)	
しそ					3回以内	2回以内	
やまのいも						4回以内(粒剤の処理は1回以内、散布は3回以内)	
アスパラガス	ネギアザミウマ	2000倍		収穫前日まで	1回	3回以内	
茶	チャノキイロアザミウマ	2000～3000倍	200～400L/10a	摘採7日前まで		1回	
	チャノミドリヒメヨコバイ						
	コミカンアブラムシ	3000倍					
	ツマグロアオカスミカメ						

殺虫剤

名称: アクトラ顆粒水溶剤
種類: チアメトキサム水溶剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
花き類・観葉植物(宿根アスター、トルコギキョウ、きくを除く)	ミカンキイロアザミウマ	1000倍	100～300L/10a	発生初期	6回以内	散布	6回以内
	ハモグリバエ類	2000倍					
宿根アスター	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
トルコギキョウ	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類 コナジラミ類	2000倍					
きく	ミカンキイロアザミウマ	1000倍					
	ハモグリバエ類	2000倍					
つつじ類	ツツジゲンバイ		200～400L/10a	5回以内	5回以内		

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	チアメトキサムを含む農薬の総使用回数
きく	ミカンキイロアザミウマ ウモンミドリカスミカメ	300g/10a	300～1000L/10a	発生初期	6回以内	灌水チューブを用いた灌注処理	6回以内