

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
小麦	紅色雪腐病	原液	4~8mL/乾燥種子1kg	は種前	1回	種子吹き付け処理	4回以内(種子への処理は1回以内、は種後は3回以内)
	株腐病		8mL/乾燥種子1kg			塗沫処理	
	うどんこ病 赤さび病	2000~3000倍	100~200L/10a	収穫7日前まで	3回以内	散布	
だいず	紫斑病	100~300L/10a	2回以内				無人ヘリコプターによる散布
	腐敗粒	16~24倍		800mL/10a			
えだまめ	べと病	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
きゅうり	うどんこ病 べと病	1500~2000倍					
	灰色かび病 菌核病	1500倍					
	褐斑病 炭疽病	2000倍					
にがうり	うどんこ病 べと病 炭疽病		100~300L/10a	3回以内	散布	3回以内	
うり類(漬物用)	うどんこ病 つる枯病 べと病 炭疽病	1500~2000倍					収穫7日前まで
メロン	うどんこ病 つる枯病 べと病	2000倍	収穫前日まで				
すいか	つる枯病 炭疽病	2000倍	100~300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
 種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
トマト	葉かび病 灰色かび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫前日まで	4回以内	散布	4回以内
なす	うどんこ病 すすかび病						
葉たまねぎ	灰色腐敗病 べと病			収穫3日前まで	3回以内		3回以内
たまねぎ	灰色腐敗病 べと病 灰色かび病			収穫前日まで	4回以内		4回以内
ねぎ	さび病 べと病 黄斑病 黒斑病 葉枯病			収穫3日前まで			5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)
わけぎ	さび病 べと病			収穫7日前まで			4回以内
あさつき	黄斑病 黒斑病			収穫3日前まで			
にら	白斑葉枯病			収穫14日前まで	2回以内		2回以内
にら(花茎)				収穫前日まで			
にんにく	さび病 葉枯病			収穫7日前まで	3回以内		3回以内

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
種類:アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
はくさい	べと病 黒斑病 白さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
	白斑病	2000～3000倍					
レタス	菌核病 灰色かび病 べと病 すそ枯病	2000倍	3L/m ²	収穫30日前 まで	2回以内	土壌灌注	4回以内(土壌 灌注は2回以 内)
	ビッグベイン病						
非結球レタス	菌核病 灰色かび病 べと病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	4回以内	散布	4回以内
キャベツ	菌核病 株腐病						
ブロッコリー	べと病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫3日前 まで	3回以内	散布	3回以内
非結球あぶら な科葉菜類(こ まつな、チンゲ ンサイ、タアサ イ、みずなを除 く)	白さび病			収穫7日前 まで	2回以内		2回以内
みずな							3回以内(粒剤 は1回以内、水 和剤は2回以 内)

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
 種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数	
こまつな チンゲンサイ タアサイ	白さび病	2000倍	100～ 300L/10a	収穫7日前 まで	2回以内	散布	3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)	
いちご	うどんこ病	1500～2000倍		苗床:4回以内	収穫前日 まで		本圃:3回以内	7回以内(苗床では4回以内、本圃では3回以内)
				苗床:4回以内			本圃:3回以内	
	炭疽病	2000倍		苗床:4回以内			本圃:3回以内	
				苗床:4回以内			本圃:3回以内	
	灰色かび病	1500倍		苗床:4回以内			本圃:3回以内	
				苗床:4回以内			本圃:3回以内	
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病	2000倍		4回以内	4回以内			
てんさい	葉腐病 褐斑病	1500倍		1500～4000倍	収穫14日前 まで		3回以内	4回以内(灌注は1回以内、散布は3回以内)
	根腐病	500倍						

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
 種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
茶	炭疽病 輪斑病 新梢枯死症 (輪斑病菌による) もち病	2000倍	100～ 400L/10a	摘採14日前 まで	3回以内	散布	3回以内
エンダイブ	菌核病			収穫21日前 まで	1回		1回
らっきょう	さび病		収穫3日前 まで	3回以内	3回以内		
パセリ	うどんこ病		100～ 300L/10a	収穫45日前 まで	1回		4回以内(粒剤 は3回以内、水 和剤は1回以 内)
みつば	灰色かび病			収穫14日前ま で 但し、伏せ 込み栽培は伏 せ込み前まで			1回
みょうが (花穂)	紋枯病		3L/m ²	収穫3日前 まで	2回以内	土壌灌注	4回以内(粒剤 は2回以内、水 和剤は2回以 内)
みょうが (茎葉)				みょうが(花 穂)の収穫3日 前まで 但し、 花穂を収穫し ない場合に あつては開 花期終了まで			
しそ	斑点病		100～ 300L/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	2回以内
	さび病						
クレソン	斑点病	100～ 300L/10a	収穫21日前 まで	3回以内	散布	3回以内	
だいこん	白さび病 ワッカ症		収穫14日前 まで			4回以内(粒剤 は1回以内、水 和剤は3回以 内)	

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
 種類:アゾキシストロピン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロピンを含む農薬の総使用回数
せり	葉枯病	2000倍	100～300L/10a	収穫7日前まで	4回以内	散布	5回以内(粒剤は1回以内、水和剤は4回以内)
あずき	さび病		60～200L/10a		収穫7日前まで		3回以内
いんげんまめ	炭疽病						
葉ごぼう	うどんこ病		100～300L/10a	収穫21日前まで	1回		1回
こおにたびらこ ははこぐさ	菌核病			収穫30日前まで			
ズッキーニ	うどんこ病			収穫前日まで	4回以内		4回以内
オクラ			2回以内		3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)		
ピーマン	灰色かび病		4回以内	4回以内	4回以内(粒剤は3回以内)		
畑わさび	白さび病		収穫7日前まで	2回以内	2回以内		2回以内
わさび			畑育苗期				
かぶ			白斑病	収穫7日前まで	3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)		
さやいんげん	灰色かび病 菌核病		100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内		3回以内
さやえんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病						

殺菌剤

名称:アミスター20フロアブル
種類:アゾキシストロビン水和剤

適用の範囲と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アゾキシストロビンを含む農薬の総使用回数
実えんどう	灰色かび病 菌核病 褐紋病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
セルリー	斑点病			収穫3日前まで	4回以内		4回以内
未成熟 そらまめ	さび病			3回以内	3回以内		
モロヘイヤ	灰色かび病			4回以内	4回以内		
ばれいしょ	夏疫病 疫病	3000～4000倍	—	収穫7日前まで	3回以内	種いも瞬間浸漬 植溝内土壌散布	5回以内(種いもへの処理は1回以内、植付時の土壌散布は1回以内、散布は3回以内)
	黒あざ病	500倍		植付前	1回		
やまのいも	葉渋病 炭疽病	2000倍	100～300L/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
せんぶり	さび病			収穫7日前まで			
しゅんぎく	炭疽病			2回以内	2回以内		
きく	白さび病			5回以内	5回以内		
たばこ	菌核病	2000～3000倍	100～180L/10a	収穫10日前まで	2回以内		3回以内(粒剤は1回以内、水和剤は2回以内)
	赤星病						