

全方位バリア、完成。

ロック&フロー効果[®]

「ロック&フロー効果[®]」で、
疫病やべと病からしっかり守る。



 **レーバス[®]**
フロアフル


syngenta.

シンジェンタ ジャパン株式会社


農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標


レーバス フロアブルなら、「ロック&フロー効果[®]」でしっかり守る。



レーバスを散布



ワックス層に吸着



葉の裏まで浸透



農林水産省登録
第22379号

有効成分：
マンジプロバミド
……………23.3%
毒物及び劇物
取締法：非該当

- 「マンジプロバミド」が、1つの有効成分で病原菌に優れた殺菌効果を発揮。
- 散布された有効成分が、速やかにワックス層に吸着。散布1時間後の雨にも強い。
- ワックス層に吸着した有効成分が葉の裏側まで浸透し、定着。効果を持続。

■適用病害の範囲及び使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数 (倍)	使用液量 (ℓ/10a)	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	マンジプロバミドを含む 農薬の総使用回数		
ばれいしょ	疫 病	375～500	25	収穫7日前まで	2回以内	散 布	2回以内		
あずき	茎疫病	1500～2000	60～200		3回以内		3回以内		
だいず		べと病						1500～3000	
ホップ	2000		200～700		収穫30日前まで		2回以内	4回以内(育苗期は2回以内、 生育期は2回以内)	
いちご		疫 病	100～300	育苗期 生育期、但し収穫前日まで					
かんきつ	褐色腐敗病	2000	200～700	収穫前日まで	3回以内		3回以内		
ぶどう	べと病			2000～3000				収穫7日前まで	
バジル		2000	100～300	収穫3日前まで	2回以内		2回以内		
はくさい				収穫7日前まで	3回以内		3回以内		
ブロッコリー					2回以内		2回以内		
レタス					3回以内		3回以内		
非結球レタス									
キャベツ				収穫3日前まで	2回以内		2回以内		
ねぎ									
ほうれんそう				収穫前日まで	2回以内		2回以内		
たまねぎ								白色疫病	
すいか								褐色腐敗病	
ミニトマト				疫 病	1500～2000		収穫前日まで	3回以内	3回以内
トマト								2回以内	2回以内
ピーマン				褐色腐敗病	2000		収穫14日前まで	3回以内	3回以内
なす	200～700							収穫10日前まで	2回以内
いちじく	疫 病	1000	100～180	収穫10日前まで	2回以内		2回以内		
たばこ									

■使用上の注意事項

- ① 使用前に容器をよく振ってから本剤の所要量を所定量の水にうすめ、よくかき混ぜてから散布してください。
- ② 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- ③ ばれいしょに対して希釈倍数375～500倍で散布する場合は、少量散布に適合したノズルを装着した乗用型の地上液剤散布装置を使用してください。
- ④ 耐性菌の出現を防ぐため、連用を避けて作用性の異なる薬剤と組み合わせ輪番で使用してください。
- ⑤ 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ⑥ 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- ⑦ 直射日光の当たらない、低温な場所に密栓して保管してください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。●使用後の空容器は圃場などに放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX21階
[ウェブサイト] <http://www.syngenta.co.jp>

