


# 幅広い作物に適用、 あなたの畑の 登録農薬です。



信頼と実績

# オルトラン<sup>®</sup> 水和剤

- 1 広範囲の害虫に高い効果を示します。
- 2 幅広い作物に適用があります。
- 3 有効成分は優れた浸透移行性を持ち、作物全体に広がります。
- 4 長期間にわたり害虫の発生を抑えます。

ヨトウムシ、アオムシ、コナガ等の食害性害虫から、アブラムシ、スリップス等の吸汁性害虫まで、広範囲の害虫に高い効果を示します。



# オルトラン®水和剤 適用害虫および使用方法

農林水産省登録 第19992号

作物名	適用病害虫名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	アセフェートを含む農薬の総使用回数		
キャベツ	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ タマナギンウバ	1000~1500	100~300 ℓ/10a	収穫30日前まで	1回	散布	2回以内 (定植時までの処理は1回以内、 定植後の散布は1回以内)		
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1000~2000							
	アザミウマ類	1000							
はくさい	カブラハバチ、ヨトウムシ ハスモンヨトウ	1500							
	アオムシ、コナガ、アブラムシ類	1500~2000							
レタス	ヨトウムシ	1000~1500							
	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ	1000							
非結球レタス	ヨトウムシ	1000~1500							
カリフラワー	アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ ヨトウムシ	1000							
非結球 あぶらな科葉菜類 (ケール、からしな、みずな、 ルッコラ、たかなを除く)	アブラムシ類	1500							
しょうが	アワノメイガ	1000							
ごぼう	アブラムシ類								
オクラ	アブラムシ類、ミドリヨコバイ								
ばれいしょ	テントウムシタマシ幼虫、ヨトウムシ アブラムシ類	300	25ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	3回以内 (植付時の処理は1回以内、植付後は2回以内)			
	アブラムシ類、ジャガイモガ ヨトウムシ、テンサイモグリハナバエ トビハムシ類	1000~1500	100~300 ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内				
てんさい	ヨトウムシ	16	1.6ℓ/10a	収穫45日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布 散布 灌注	4回以内 (育苗期の灌注は1回以内、散布は3回以内)		
	トビハムシ類	300	25ℓ/10a						
	アブラムシ類	60~100	2.5~3ℓ/m <sup>2</sup>						
未成熟とうもろこし	アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内	散布	2回以内		
あずき	アスキノメイガ、アブラムシ類 ヨトウムシ			収穫14日前まで	3回以内				
だいず	ハスモンヨトウ、マメシクイガ アブラムシ類			収穫60日前まで	3回以内				
えだまめ	アブラムシ類	16	1.6ℓ/10a	収穫21日前まで	3回以内	無人ヘリコプターによる散布	3回以内		
いんげんまめ	アブラムシ類 インゲンマメゾウムシ	1000	100~300 ℓ/10a	収穫14日前まで	3回以内				
たまねぎ	ネギアザミウマ	1000~1500	200~700 ℓ/10a	収穫21日前まで	5回以内	無人ヘリコプターによる散布	5回以内		
		300						25ℓ/10a	
		16						1.6ℓ/10a	
にんにく	ネギコガ、アブラムシ類	1000	100~300 ℓ/10a	収穫7日前まで	2回以内		2回以内		
ぶどう	チャノキイロアザミウマ フタテンヒメヨコバイ ハマキムシ類	1500~2000	200~700 ℓ/10a	収穫60日前まで	1回	2回以内	1回		
	カキクダアザミウマ チャノキイロアザミウマ カキノヘタムシガ、フジコナカイガラムシ	1500		収穫45日前まで	2回以内				
かき	アザミウマ類	2000							
いちじく	チャノキイロアザミウマ チャノミドリヒメヨコバイ	1000~2000	200~400 ℓ/10a	摘採45日前まで	1回	1回	1回		
	チャノコカクモンハマキ	1000~1500							
さんしょう(果実)	チャノキイロアザミウマ	1500	200~700 ℓ/10a	収穫14日前まで					
だいおう	ヨトウムシ	1000	100~300 ℓ/10a	生育期 但し、 収穫230日前まで	3回以内	散布	3回以内		
みしまさいこ	アブラムシ類	1500		収穫30日前まで	5回以内				
薬用にんじん				収穫180日前まで	3回以内				
ソルガム				収穫30日前まで	3回以内				
やまのいも	ヤマノイモコガ アブラムシ類	1000		収穫45日前まで	1回				
葉しょうが	アワノメイガ			収穫21日前まで					
たばこ	ヨトウムシ、タバコアオムシ アブラムシ類	1500~2500		25~180 ℓ/10a	収穫10日前まで			2回以内	2回以内
	ヤサイゾウムシ	1000~2000		1ℓ/m <sup>2</sup>	苗床期				
	ジャガイモガ若齢幼虫 ジャガイモガ中齢幼虫	1500~2000		25~180 ℓ/10a	収穫10日前まで				
つつじ類	ツツジグンバイ	1500		200~700 ℓ/10a					
つばき類	チャドクガ								
ざくら	モンクロシャチホコ アメリカシロヒトリ	1000~1500 1500~2000							
花き類・観葉植物	アザミウマ類、アブラムシ類	1000~1500	100~300 ℓ/10a	発生初期	5回以内	5回以内			
	アオムシ、ヨトウムシ類								
	マメハモグリバエ、オオタバコガ								
	コナガ、ハイマダラノメイガ								
	ヨメナスジハモグリバエ								
	カイガラムシ類								
	コナガ								
	ひまわり	タバコガ							
	斑入りアマドコロ リアトリス	ハマキムシ類							
	樹木類	アザミウマ類					200~700 ℓ/10a		
グラジオラス			植付時	1回	10分間球根浸漬				
芝	シバツトガ、タマナヤガ スジキリヨトウ、ケラ		0.25~2ℓ/m <sup>2</sup> 1~2ℓ/m <sup>2</sup> 2ℓ/m <sup>2</sup>	発生初期	5回以内	散布			
	シバオサゾウムシ成虫		0.5~1ℓ/m <sup>2</sup>						
	アカフツツリガ								
もりあざみ	アブラムシ類	1500	100~300 ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	1回			
まめ科牧草		1000			3回以内	3回以内			

2017年3月現在の登録内容

●ラベルをよく読む。●記載以外には使用しない。●小児の手の届く所には置かない。●空袋は圃場などに放置せず、適切に処理する。

●適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病虫害防除等関係機関の指導を受けることが望まれます。

アリスタライフサイエンス株式会社

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1  
TEL 03-3547-4416 FAX 03-3547-4695

オルトラン水和剤 検索