

**FMC**

野菜・畑作用殺虫剤

# プリバント フロアブル5<sup>®</sup>

powered by  
RYNAXYPYR<sup>®</sup>



## 品質と収量の安定は、健全な苗から。

## ■プレバソソ<sup>®</sup> フロアブル5の適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロントラコリプロールを含む農薬の総使用回数	
キャベツ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ネキリムシ類 カブラハバチ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壤約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類	500倍	苗地床1m <sup>2</sup> 当り2ℓ					
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ ウワバ類 オオタバコガ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
はくさい	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壤約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布		
	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ							
かぶ	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ カブラハバチ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	2回以内	散布	3回以内	
非結球あぶらな科 葉菜類 (タアサイを除く)	コナガ						2回以内	
タアサイ	オオタバコガ	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壤約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、散布は2回以内)	
あすっこ	アオムシ						1回	
アマランサス (茎葉)	シロオビノメイガ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内	
なばな	アオムシ ハスモンヨトウ						4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	
だいこん	コナガ アオムシ ヨトウムシ ハイマダラノメイガ カブラハバチ						3回以内	
はつかだいこん	ハモグリバエ類	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壤約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	収穫前日まで	1回	散布	1回	
カリフラワー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ						3回以内	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハスモンヨトウ ハイマダラノメイガ						4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
はなっこりー	アオムシ	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ						4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
ハモグリバエ類	1000~2000倍	100倍	セル成型育苗トレイ1箱またはペーパーポット1冊(約30×60cm、使用土壤約1.5~4ℓ)当り0.5ℓ	育苗期後半~定植当日	1回	灌注	3回以内 (灌注は1回以内、散布は2回以内)	
ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類 ネキリムシ類 ヒメフタテンヨコバイ	1000~2000倍						4回以内 (定植時までの処理は1回以内、散布は3回以内)	
非結球レタス	ヨトウムシ ハスモンヨトウ オオタバコガ ハモグリバエ類	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	4回以内 (灌注は1回以内、散布は3回以内)	