

浸透移行性殺菌剤



アリエッティ[®]
水和剤



べと病



べと病



疫病

作物の自己防衛機能強化による確かな効きめ



べと病



べと病



褐色腐敗病

多くの作物をカバーする確かな効きめ

アリエッティ水和剤



登録番号：第15548号

●成分：ホセチル……………80.0%

●毒性：普通物（「毒物および劇物取締法」にもとづく毒物・劇物に該当しないものを指している）

特異な作用性

ホセチルは直接的な殺菌作用と、間接的な抵抗性誘導作用により効果を発揮します。

浸透移行性に優れる

浸透移行性に優れ、植物体内の樹液の流れによって速やかに上下方向に移行。散布後に展開した新葉も保護します。

耐性菌の心配が少ない

優れた二つの作用により耐性菌の心配はほとんどありません。また、既存の殺菌剤とは作用性が全く異なるため、交差耐性の心配もほとんどありません。

適用病害および使用方法

2015年6月現在の登録

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	10アール当り使用液量(ℓ)	使用時期*	使用回数*	使用方法	
ぶどう	べと病	800	200~700	30日	3回	散布	
かんきつ	苗疫病	400~800		前日			
	褐色腐敗病			14日			
なし	黒斑病	800		幼果期 但し120日			2回
	輪紋病	800~1000		7日			3回
キウイフルーツ	果実軟腐病		600	植付時	1回	苗浸漬	
パッションフルーツ	疫病	800	—	開花期	2回 (苗浸漬は1回)	土壌灌注	
パイナップル	心腐病	200	100mℓ/株	60日	1回	散布	
さるなし	心腐病	400~800	200~700	前日	3回		
	根腐萎凋病			7日			
	果実軟腐症			60日			
りんご	すす点病	800~1000	100~300	前日	2回		
	すす斑病			1000			
	斑点落葉病						
にんじん	黒葉枯病	800	7日	3回			
かぼちゃ	疫病	400~800	前日				
	べと病		3日				
きゅうり	べと病	800	前日		2回		
メロン	べと病						
ねむぎ	べと病	1500	200mℓ/株		大土寄せ時		2回
わけぎ	疫病						
ほうれんそう	べと病	1000	200~700		前日		3回
みつば	白斑病						
畑わさび(根莖)	べと病	600	100~300		14日 但し 伏せ込み栽培は 伏せ込み前まで	2回	
わさび(根莖)	べと病						
サラダ菜	褐斑病	1500	21日	3回			
エンサイ	白さび病	1000	畑育苗期				
たばこ	疫病	400~800	3日	2回			
	舞病		7日				
ホップ	べと病	800	100mℓ/株	移植時	株元灌注		
			200~700	14日	3回	散布	

*印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫前の日数と、本剤およびその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示します。

上手な使い方

- 予防散布を主体とし、発生前から初発時に散布すると効果的です。
- 作物の生長が盛んな時期の散布は、とくに効果があります。

▲ 使用上の注意事項

- 散布液調製後できるだけ速やかに散布して下さい。
- 石灰硫黄合剤およびボルドー液との混用は避けて下さい。また、無機銅を含む剤との混用および近接散布は薬害を生じるおそれがあるので避けて下さい。
- ほうれんそう、わけぎに使用する場合、誤って高濃度で散布すると薬害を生じることがありますので、所定濃度を厳守し、重複散布を避けて下さい。
- なし(但し、幸水、豊水を除く)に使用する場合、6月中旬までの散布は、葉に薬害を生じるおそれがあるので避けて下さい。なお、幸水及び豊水に使用する場合、6月中旬までの散布は、葉にクロロシス等を生じる場合がありますが、通常は実用上問題ない程度です。
- かんきつに使用する場合、未硬化葉がコルク化する薬害が生じるおそれがあるので留意して下さい。
- みかんに使用する場合、高温時は日焼け果発生を助長するおそれがあるので注意して下さい。
- ぶどうに使用する場合、幼果期から果粒肥大期の散布は、果粉の溶脱を引き起こしますので使用は避け、新梢伸長期から落花期までおよび袋掛け以降に使用して下さい。
- 本剤を使用したわさびの苗を畑地からわさび田に移植する場合には、使用した農薬がわさび田の水系に持ち込まれないよう、わさびの苗に付着した土を十分に洗い落として下さい。
- ☆フロアブル剤と混用する場合、必ずフロアブル剤を最初に所定濃度に希釈してから本剤を加えて下さい。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

バイエルクロップサイエンス株式会社

東京都千代田区丸の内1-6-5 〒100-8262 www.bayercropscience.co.jp

お客様相談室： ☎ 0120-575-078 (9:00~12:00, 13:00~17:00 土・日・祝日をのぞく)

(F-2017 15.06.JWT)