

除草剤

バスタ[®]液剤

[®]=BASF社の登録商標

有効成分

グルホシネート 18.5%

登録番号：第20958号

性 状：青緑色澄明水溶性液体

毒 性：普通物*

有効年限：4年

包 装：500ml×20本

1ℓ×12本

2.2ℓ×6本(系統のみ)

5ℓ×4本

10ℓ×2本(系統のみ)

*普通物：毒劇物に該当しないものを指している通称

バスタ液剤の詳細については、特設サイト(<https://www.basta.jp/>)でもご覧いただけます。

■適用雑草と使用方法

(2018年9月12日現在)

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数				
				薬量	希釈水量							
小麦	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300~ 750ml /10a	100~ 150ℓ /10a	1回	雑草 茎葉 散布	4回以内 (は種後は3回以内)				
	—		は種後出芽前 (雑草生育期)									
	圃場内の 周縁部		収穫7日前まで (雑草生育期)						3回以内			
大麦	—		は種前 (雑草生育期)	300~ 500ml /10a		1回			3回以内	3回以内		
	—		は種後出芽前 (雑草生育期)									
	圃場内の 周縁部		収穫7日前まで (雑草生育期)									
そば	—		は種前 (雑草生育期)	—		—					3回以内	3回以内
	—		は種後出芽前 (雑草生育期)									
	圃場内の 周縁部		収穫前日まで (雑草生育期)									

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
かんきつ りんご	—	一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	3回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
		多年生雑草		500～ 1000mℓ /10a				
ぶどう なし おうとう かき もも 小粒核果類 ネクタリン ブルーベリー		一年生雑草	収穫前日まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
		多年生雑草		500～ 1000mℓ /10a				
いちじく		一年生雑草	収穫21日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
びわ キウイフルーツ		多年生雑草		500～ 750mℓ /10a				
		いちょう (種子)	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)				
多年生雑草			500～ 1000mℓ /10a					
くり		一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	300～ 500mℓ /10a				
		多年生雑草		500～ 750mℓ /10a				
キャベツ はくさい	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a	2回以内				
きゅうり なす ピーマン とうがらし類 トマト ミニトマト いちご		収穫前日まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)		3回以内				
		2回以内						
すいか ねぎ たまねぎ ブロッコリー ズッキーニ にがうり		2回以内						

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
だいこん	—	一年生雑草	収穫45日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)	300～500mℓ /10a	100～150ℓ /10a	雑草茎葉散布	2回以内	2回以内		
はつかだいこん たかな ほうれんそう			収穫7日前まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)						3回以内	3回以内
みつば みしまさいこ			収穫30日前まで (雑草生育期定植前又は畦間処理)							
メロン レタス 非結球レタス かぼちゃ			収穫前日まで (雑草生育期は種前又は畦間処理)						3回以内	3回以内
ごぼう			収穫前日まで (雑草生育期萌芽前又は畦間処理)						2回以内	2回以内
にんじん オクラ			収穫30日前まで (雑草生育期植付前又は畦間処理)						3回以内	3回以内
アスパラガス			収穫14日前まで (雑草生育期挿苗前又は畦間処理)	2回以内					2回以内	
さといも やまのいも			雑草生育期植付前又は植付後萌芽前	3回以内					3回以内	
かんしょ			収穫30日前まで (雑草生育期畦間処理)	300～500mℓ /10a					3回以内	3回以内
こんにゃく			雑草生育期植付前又は植付後萌芽直前	100～200mℓ /10a					1回	3回以内 (萌芽前は1回以内、萌芽後は2回以内)
ばれいしょ			収穫21日前まで (畦間処理:雑草生育期)	300～500mℓ /10a					2回以内	

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
豆類 (種実、ただし、 だいずを除く)	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	3回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内
			定植5日前まで (雑草生育期)					
			収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)					
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
収穫28日前まで (畦間処理: 雑草生育期)								
収穫28日前まで (株間処理: 本葉5葉期以降 雑草生育期)								
は種前 (雑草生育期)								
は種後出芽前 (雑草生育期)								
定植5日前まで (雑草生育期)								
えだまめ			収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)					
なばな	収穫21日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)							
かぶ	は種前 (雑草生育期)	2回以内	2回以内					
	定植前 (雑草生育期)							
	収穫21日前まで (畦間処理: 雑草生育期)							

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数		
				薬量	希釈水量					
にら さやいんげん さやえんどう 実えんどう 未成熟そらまめ	—	一年生雑草	は種前 (雑草生育期)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	3回以内		
			定植前 (雑草生育期)						3回以内	
			収穫前日まで (畦間処理: 雑草生育期)							
しろうり			1回							1回
ほうきぎ			3回以内						3回以内	
にんにく			2回以内						2回以内	
しょうが			3回以内						3回以内	
葉しょうが			2回以内						2回以内	
食用ぎく										は種前 (雑草生育期)
										定植前 (雑草生育期)
	収穫14日前まで (畦間処理: 雑草生育期)									
水田作物	1回	1回								
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	一年生雑草 多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500～ 1000mℓ /10a	2回以内	2回以内	2回以内			
水田作物 畑作物 (休耕田)	休耕田		雑草生育期 (草丈50cm以下)					3回以内	3回以内	
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	雑草生育期	1回	1回						
セルリー	—	一年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a	3回以内	3回以内	3回以内			
さんしょう (果実)		多年生雑草	収穫7日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)	500～ 750mℓ /10a	2回以内	2回以内	2回以内			

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
しそ (花穂)	—	一年生雑草	収穫14日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	2回以内	雑草 茎葉 散布	2回以内
食用桑(葉) 食用桑(果実)			収穫45日前まで (雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前)			3回以内		3回以内
パセリ			収穫3日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内
もりあざみ			収穫30日前まで (雑草生育期 は種前又は 畦間処理)			3回以内		3回以内
ふき			収穫120日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内
ふき (ふきのとう)			収穫75日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)			2回以内		2回以内
たけのこ			収穫30日前まで (雑草生育期: 草丈30cm以下)					
たらきのき			収穫45日前まで (雑草生育期: 植付前又は 畦間処理)			3回以内		3回以内
なたね			収穫30日前まで (雑草生育期: は種前又は 畦間処理)			1回		1回
茶			摘採7日前まで (雑草生育期 畦間処理)			2回以内		2回以内
花き類・ 観葉植物			雑草生育期 畦間処理 (草丈20cm以下)			3回以内		3回以内
樹木類			雑草生育期					

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	使用量		本剤の使用回数	使用方法	グルホシネート及びグルホシネートPを含む農薬の総使用回数
				薬量	希釈水量			
樹木等	公園 庭園 堤とう 駐車場 道路 運動場 宅地 のり面 鉄道等	一年生雑草	雑草生育期	500～ 1000mℓ /10a	100～ 200ℓ /10a	3回以内	植栽地を除く樹木等の周辺地に雑草茎葉散布	3回以内
		多年生雑草		1000～ 2000mℓ /10a				
日本芝 (こうらいしば)	—	一年生雑草	雑草生育期 芝休眠期	300～ 500mℓ /10a	100～ 150ℓ /10a	1回	雑草茎葉散布	1回
たばこ			植付10日前まで (雑草生育期)	200～ 300mℓ /10a				
桑			大土寄期 (雑草生育期 畦面・畦間処理)					
とうき			雑草生育期 春期萌芽前及び 夏切り後萌芽前					
とうき(葉)			収穫30日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)	300～ 500mℓ /10a		3回以内		3回以内
			収穫7日前まで (雑草生育期 定植前又は 畦間処理)					